

Dimestil 1 mg/g Gel. Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Linderung von Pruritus bei Dermatosen, Urtikaria, Insektenstichen, Sonnenbrand und oberflächlichen Hautverbrennungen (ersten Grades). Zur Behandlung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter ab 1 Monat.

Warnhinweise: Dimestil 1 mg/g Gel wird bis zu 3-mal täglich dünn auf die betroffenen und juckenden Hautstellen aufgetragen. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die maximale Behandlungsdauer ohne Rücksprache mit einem Arzt beträgt 7 Tage. Dimestil sollte bei Kindern im Alter von 1 Monat bis 2 Jahren unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Grindeks Kalceks Deutschland GmbH, 47533 Kleve; Stand: 05/2024.**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.