

Dimestil® 1mg/g Gel

Dimestil®

Wirkstoff: Dimetindenmaleat

Packungsgrößen: Dimestil 1 mg/g Gel 30g N1

PZN: 19183948

Dimestil®

Dimestil ist ein lokal anzuwendendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Dimetindenmaleat, das speziell zur Linderung von Juckreiz und Hautirritationen entwickelt wurde. Das Gel ist farblos, leicht aufzutragen und zieht schnell ein.

Das Gel wird zur Behandlung von juckenden Hautzuständen wie Insektenstichen, leichten Verbrennungen, Sonnenbrand und allergischen Hautreaktionen wie Nesselsucht verwendet. Es eignet sich für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab einem Alter von einem Monat. Dimestil sollte bei Bedarf bis zu dreimal täglich dünn auf die betroffene Hautstelle aufgetragen werden. Wichtig ist, das Gel nicht auf offenen Wunden, großflächig geschädigter Haut oder entzündeten Stellen anzuwenden. Zudem sollte der Kontakt mit Schleimhäuten vermieden werden.

Dimestil wirkt, indem es den Juckreiz lindert und die Haut beruhigt. Die kühle Wirkung des Gels verstärkt das Gefühl der Linderung und macht es besonders angenehm bei gereizter Haut. Aufgrund seiner guten Verträglichkeit ist Dimestil auch für empfindliche Haut geeignet.

Grindeks ist ein weltweit tätiger, europäischer Arzneimittelhersteller mit Sitz in Riga, Lettland und verfügt über 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Arzneimitteln.

In Deutschland bieten wir unsere Arzneimittel unter zwei Marken an, Grindeks und Kalceks, mit einem spezialisierten Portfolio in Bereichen wie Neurologie, Onkologie, Diabetes und Dermatologie. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften und Patienten mit innovativen und einfachen Lösungen gleichermaßen zu erfüllen.

Pflichttext:

Dimestil 1 mg/g Gel. Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Linderung von Pruritus bei Dermatosen, Urtikaria, Insektenstichen, Sonnenbrand und oberflächlichen Hautverbrennungen (ersten Grades). Zur Behandlung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Alter ab 1 Monat. **Warnhinweise:** Dimestil 1 mg/g Gel wird bis zu 3-mal täglich dünn auf die betroffenen und juckenden Hautstellen aufgetragen. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die maximale Behandlungsdauer ohne Rücksprache mit einem Arzt beträgt 7 Tage. Dimestil sollte bei Kindern im Alter von 1 Monat bis 2 Jahren unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Grindeks Kalceks Deutschland GmbH, 47533 Kleve; Stand: 05/2024.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Dim-E-0524-01